



Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat

## G N G RÇ K YAĞI

**Beynəlxalq patentləşdirilmiş adı:** Castor oil

### **Tərkibi:**

Gənəgərçək yağı.

### **Təsviri**

Şəffaf, qatı, özlü, rəngsiz və ya zəif sarımtıl rəngli məhluldur.

### **Farmakoterapevtik qrupu**

İşlədici dərman vasitəsi.

## İstifadəsinin göstərişləri

Kəskin qəbizlik, zəhərlənmələr, qida toksikoinfeksiyaları, diaqnostik prosedurlardan əvvəl bağırsağın təmizlənməsi. Mamalıq təcrübəsində gənəgərçək yağından bəzi hallarda uşaqlıq əzələsinin yığılma qabiliyyətini gücləndirmək üçün istifadə edilir (doğuş fəaliyyəti zəif olduqda).

## Əks göstərişləri

Yağda həll olan dərman maddələri ilə (fosfor, benzol, və s), həmçinin erkək ayıdöşəyi ekstraktı ilə zəhərlənmələrdə, qurdqovucu dərmanlərin tətbiqi zamanı (gənəgərçək yağı bu maddələri həll edərək onların qana sorulmasını sürətləndirir) və hamiləlik dövründə istifadəsi əks göstərişdir.

## Əlavə təsirləri

Aşkar olunmayıb.

### **Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri**

Yağda həll olan dərman maddələri üçün həlledici kimi, məlhəm və linimentlərin hazırlanmasında məlhəm əsası kimi istifadə oluna bilər.

### **Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi**

Hamiləlik dövründə istifadəsi əks göstərişdir. Laktasiya dövründə istifadə oluna bilər.

### **İstifadə qaydası və dozası**

Böyüklərə daxilə 15-30 q, uşaqlara 5-10-15 qr (1 çay, desert və ya xörək qaşığı) təyin edilir. Doğuş fəaliyyətinin zəifliyində daxilə 40-50 q təyin olunur. Bu məqsədlə gənəgərçək yağı adətən, xinin, pitiutrin (və ya paxikarpin) və uşaqılıq əzələsinin yığılma qabiliyyətini gücləndirən digər dərman vasitələri ilə birlikdə təyin edilir.

### **Doza həddinin aşılması**

Doza həddinin aşılması halı müşahidə edilməmişdir. Hər halda, bu baş verərsə preparatdan istifadəni dayandırmaq və həkimə müraciət etmək lazımdır.

### **Buraxılıř forması**

30, 50 ml řüşşə flakonlarda buraxılır. 1 flakon içlik vərəqə ilə birgə qutuya yerləşdirilir.

### **Saxlanma řə raiti**

12-15°C temperaturda, qaranlıq və uřaqların əli çatmaayan yerdə saxlamaq lazımdır.

### **Yararlılıq müddə ti**

5 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

## Aptekdə n buraxılma şərti

Resepsiz buraxılır.

## İstehsalçı

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

[Təlimatı yüklə](#)