



**Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat**

**Faqolin məlhəmi 30 q**

**Tərkibi:**

Fıstıq yağı - 0,9 q

D-pantenol -1,5 q

*Kömü kçi maddü r:* vazelin yağı, distillə monoqliserid, qliserin, nipagin, nipazol, təmizlənmiş su.

**Farmakoloji tı siri:** Faqolin məlhəmi irinli-septiki yara infeksiyalarının bir çox törədiciyinə (Staphylococcus aureus; Proteus vulgaris; Klebsiella pneumoniae) antimikrob təsir göstərir. Dekspantenol asetilləşmə və oksidləşmə proseslərində mühüm rol oynamaqla yanaşı, həmçinin, şəkər və piy mübadiləsində, eləcə də asetilxolinin sintezində fəal iştirak edir. Preparat antimikrob, iltihab əleyhinə, membranstabilizirici, antioksidant və yarasağaldıcı təsir göstərir.

### **İstifadə sinü aid göstü rişü r:**

-stafilokokklar tərəfindən törədilən piodermiyalar;

-irinli yaralar (yara prosesinin birinci mərhələsində);

-yüngül və orta dərəcəli yanıqlar;

-yumşaq toxumaların yaraları, o cümlədən, cərrahi əməliyyatdan sonrakı yaralar, çətin sağalan dəri transplantantları, trofik yaralar, dəri çatları;

-dermatitlər.

### **İstifadə qaydası vü dozası:**

Preparatı yara nahiyəsi irindən təmizləndikdən sonra bağlı sarıq etmək lazımdır. Piodermiyaların müalicəsində məlhəmi zədələnmiş nahiyəyə hər gün iki dəfə, yanıt yerinə isə gündə 2-3 dəfə sürtmək lazımdır. "Faqolin" məlhəminin müalicə müddəti xəstəliyin ağırlıq dərəcəsiindən asılı olaraq 10-30 gündür.

**İlavə təsiri:**

Preparatın əlavə təsiri müəyyən olunmamışdır.

**İks göstərici:**

Faqolini tərkibində ağır metal duzları olan preparatlarla birgə istifadə etmək məsləhət görülmür.

**Buraxılış forması:**

Məlhəm, 30q-lıq alüminium tüblərdə buraxılır.

**Saxlanma şəraiti:**

Quru, işıq şüasından qorunan, 20<sup>0</sup>C temperaturdan artıq olmayan şəraitdə saxlanılmalıdır.

**Yararlılıq müddəti:**

İstehsal tarixindən 2 il.

**Aptekdə n buraxılma şərti**

Resepsiz buraxılır.

**İstehsalçı**

«Azərfarm» LTD, Azərbaycan resp., Bakı ş., Bakıxanov qəs., Bünyadov küç., 14.

[Təlimatı yüklə](#)